

**Dr. Alessio Redaelli**

**Via Di Vittorio 24 20070 DRESANO**

**Modulo di consenso informato per l'impianto di Acido ialuronico**

**Il/la sottoscritto/a** \_\_\_\_\_ **di anni** \_\_\_\_\_

**residente a** \_\_\_\_\_ **in Via** \_\_\_\_\_

**Tel.** \_\_\_\_\_

in vista dell'atto medico-terapeutico sopra indicato conferma di essere stato/a esaurientemente informato/a sulla natura e sugli effetti conosciuti dell'intervento medico richiesto e di seguito descritto.  
Il consenso è personale e non delegabile ai familiari (se non per minori o soggetti a tutela).

L'acido ialuronico è un polisaccaride naturale presente in tutti gli organismi viventi. L'acido ialuronico iniettabile per uso estetico può essere di origine animale (creste di gallo) o di sintesi (fermentazione batterica) Tale sostanza, a differenza del collagene, è esente dal rischio di reazioni di tipo allergico (come risulta da un'ampia letteratura a livello mondiale). Con l'acido ialuronico è possibile ridurre la profondità delle rughe ed aumentare i volumi sottocutanei. Si può anche aumentare il contorno, il volume e la carnosità delle labbra.  
Nella fase successiva l'impianto, per alcuni giorni e raramente, si riscontra gonfiore ed arrossamento della parte trattata che di norma regredisce spontaneamente senza nessuna altra complicanza; raramente si possono formare dei piccoli ematomi. Sono descritti noduli immediati e tardivi.

Nei 2-3 giorni successivi il trattamento, sarà opportuno evitare l'esposizione a temperature troppo calde o troppo fredde.

La durata della correzione è variabile in base alla frequenza con cui viene sollecitata la zona sede dell'impianto; in media possiamo considerare un tempo di circa 6 mesi, ma può essere anche molto meno ed in ogni caso è variabile da paziente a paziente.

L'impianto di acido ialuronico non è particolarmente doloroso. Si utilizza una crema anestetica mezz'ora prima del trattamento. A volte può rendersi necessaria una anestesia iniettiva.

In letteratura sono riferite rarissime reazioni infiammatorie ed infettive. Inoltre, sono possibili ischemie dei tessuti trattati con possibili, rarissime necrosi dei tessuti. Utilizzando acido ialuronico è possibile l'utilizzo della ialuronidasi per sciogliere l'acido ialuronico che ha creato il problema. In caso di problemi avvertire immediatamente il medico. Possono rendersi necessarie sedute di ritocco anche a breve distanza di tempo.

Le procedure ed i mezzi utilizzati sono quelli che allo stato attuale vengono riconosciuti i più idonei da un punto di vista medico-scientifico.

Dichiaro comunque di non essere in gravidanza e di essere allergica alle seguenti sostanze:

.....

e di aver già eseguito le seguenti terapie estetiche:

.....

Autorizzo la gestione dei dati anche iconografici e per pubblicazioni medico scientifiche.  
Preso atto della situazione illustrata, accetto le procedure mediche proposte

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma del paziente**

**Firma del medico**